



FICHA TÉCNICA

RASTOP PELLET



COMPOSICIÓN	Bromadiolona 0,005%
PREVENTIVO INGESTA HUMANA	Benzoato de denantonio 0,001%
ANTÍDOTO	Vitamina K1 (Fitomendadiona)
REGISTRO ISP	P-729/20
CLASE TOXICOLÓGICA	Clase IV OMS, productos que normalmente no ofrecen peligro
FORMATOS	Envases de 50 gr. - 250 gr. - 500 gr. - 1 kg. y 5 kg.

RASTOP PELLET es un atractivo y eficaz rodenticida formulado con Bromadiolona, rodenticida monodósico derivado de la 4-hidroxy cumarina y una balanceada mezcla de granos de grado alimenticio, rico en proteína, aceites y carbohidratos de alta palatabilidad para el consumo de roedores plaga en ambientes urbanos, industriales, rurales donde existe alta oferta ambiental de alimentos. El adecuado tamaño de los pellets ha sido desarrollado para la optimización de la manipulación y consumo por parte del roedor, facilitando incluso su conducta de acarreo de alimentos a la madriguera.

RASTOP PELLET posee un atractivo aroma, resaltando su capacidad de atracción y de búsqueda activa por parte del roedor, lo que junto a sus condiciones organolépticas favorecen altos consumos de los cebos y el éxito de los programas de control.

RASTOP PELLET posee un eficaz preventivo de la ingesta humana accidental, sustancia amargante (benzoato de denantonio) que protege del consumo involuntario en personas, pero que no es detectado por los roedores al momento del consumo.

RASTOP PELLET está envasado en sachet de papel seroso de doble poro, de alta tecnología, que permite la salida del aroma del sobre, pero que retarda el ingreso de la humedad ambiental, prolongando la palatabilidad del producto una vez aplicado.

RASTOP PELLET está recomendado para uso en interiores. Puede ser usado en exteriores, procurando su uso en lugares secos y sin contacto con el agua. Se recomienda su uso en cajas cebaderas o tubos cebaderos, de manera de proteger de accidentes, prolongar la vida útil del producto aplicado y facilitar el consumo de los roedores.



RECOMENDACIONES DE USO

RASTOP PELLET está indicado para el control de roedores sinantrópicos en diferentes tipos de ambientes, siendo un producto ideal para el establecimiento de Programas de Control Integrado de Plagas. Utilice **RASTOP PELLET** al ver roedores o señales indirectas de su presencia (fecas, roeduras, etc.).

MODO DE ACCIÓN

RASTOP es un efectivo y potente inhibidor de la síntesis de protrombina, generando el control de los roedores entre 2 y 3 días posterior al consumo.

DOSIS

USO	APLICACIÓN	DOSIS
Para el control en interiores de bodegas, entretechos y cielos falsos, edificios, hoteles, lugares públicos, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros.	Uso en interiores, junto a paredes o en entretechos, detrás de muebles o despensas, lavaderos y lugares resguardados. Para mayor seguridad prefiera siempre el uso de cajas cebaderas o tubos cebaderos.	Ratas: Aplicar 1 a 2 sachet cada 5 metros lineales (alta carga de roedores) a 10 metros lineales (mantenimiento). Ratones o Lauchas: 1 sachet cada 2 a 4 metros lineales.